Gátmetszés: kockázat a következõ szülésnél

A gát berepedezését megelõzõ metszés problémákat okozhat a következõ szüléseknél - közli egy amerikai tanulmány.

Az elsõ szülésnél alkalmazott gátmetszés a következõ szüléseknél nagyobb valószínûséggel okoz berepedést vagy szakadást a gáttájékon - állapítja meg Marianna Alperin és csoportja, az Obstetrics and Gynecology címû orvosi szaklapban közölt tanulmányában.

A kutatók a Pittsburgh-i Egyetemen hatezernél több szülõ nõ adatait elemezték tízéves idõtávot figyelembe véve. A nõk közel felénél (47,8 százalékánál) alkalmaztak gátmetszést elsõ szülésüknél, ezt követõen második szülésüknél 51,3 százalékuknál jelentkeztek mérsékelt beszakadások. Ezzel szemben azoknál a nõknél, akik gátmetszés nélkül szültek elsõ alkalommal, a második szülésnél a közepes mértékû gátsérülések aránya csak 26,7 százalék volt.

A súlyos gátsérüléseket tekintve ezek az arányok: 4,8 százalék a gátmetszésen átesetteknél és 1,7 százalék azoknál, akiknél nem alkalmaztak gátmetszést. A tanulmány szerzõi felhívják a szülészek figyelmét, hogy korlátozzák a gátmetszés rutinszerû használatát.

Forrás: MTI