Gátmetszés: kockázat a következõ szülésnél

A gÃ¡t berepedezÃ©sÃ©t megelõzõ metszÃ©s problÃ©mÃ¡kat okozhat a kÃ¶vetkezõ szÃ¼lÃ©seknÃ©l - kÃ¶zli egy amerikai ta

Az elsõ szÃ¼lÃ©snÃ©l alkalmazott gÃ¡tmetszÃ©s a kÃ¶vetkezõ szÃ¼lÃ©seknÃ©l nagyobb valÃ³szÃ-nûsÃ©ggel okoz bereped szakadÃ¡st a gÃ¡ttÃ¡jÃ©kon - Ã¡llapÃ-tja meg Marianna Alperin Ã©s csoportja, az Obstetrics and Gynecology cÃ-mû orvosi szaklapban kÃ¶zÃ¶lt tanulmÃ¡nyÃ¡ban.

A kutatÃ³k a Pittsburgh-i Egyetemen hatezernÃ©l tÃ¶bb szÃ¼lõ nõ adatait elemeztÃ©k tÃ-zÃ©ves idõtÃ¡vot figyelembe vÃ©ve. kÃ¶zel felÃ©nÃ©l (47,8 szÃ¡zalÃ©kÃ¡nÃ¡l) alkalmaztak gÃ¡tmetszÃ©st elsõ szÃ¼lÃ©sÃ¼knÃ©l, ezt kÃ¶vetõen mÃ¡sodik szÃ¼ 51,3 szÃ¡zalÃ©kuknÃ¡l jelentkeztek mÃ©rsÃ©kelt beszakadÃ¡sok. Ezzel szemben azoknÃ¡l a nõknÃ©l, akik gÃ¡tmetszÃ©s nÃ© szÃ¼ltek elsõ alkalommal, a mÃ¡sodik szÃ¼lÃ©snÃ©l a kÃ¶zepes mÃ©rtÃ©kû gÃ¡tsÃ©rÃ¼lÃ©sek arÃ¡nya csak 26,7 szÃ¡zalÃ

A sÃºlyos gÃ¡tsÃ©rÃ¼lÃ©seket tekintve ezek az arÃ¡nyok: 4,8 szÃ¡zalÃ©k a gÃ¡tmetszÃ©sen Ã¡tesetteknÃ©l Ã©s 1,7 szÃ¡zalÃ akiknÃ©l nem alkalmaztak gÃ¡tmetszÃ©st. A tanulmÃ¡ny szerzõi felhÃ-vjÃ¡k a szÃ¼lÃ©szek figyelmÃ©t, hogy korlÃ¡tozzÃ¡k a gÃ¡tmetszÃ©s rutinszerû hasznÃ¡latÃ¡t.

ForrÃ¡s: MTI